PRO MAS SUKRO/SU®

Ficha Técnica

Información General:

La mezcla total de **PRO MÁS SUKRO / SU®** y **PRO MÁS SUKRO / KRO®**en relación uno a uno, proporcionan diversos nutrientes que ayudan a incrementar la tasa fotosintética, eficientiza la captación de luz, mejorar el aprovechamiento de la energía y la adecuada transportación de fotosintatos a los tejidos de reserva.

El Ácido Ortosilícico de **PRO MÁS SUKRO®** se acumula en forma de cristales incrementando la fotosíntesis. La acumulación de Silicio en los tejidos induce la formación de estructuras de conducción (Traqueidas) mejorando el transporte de carbohidratos de las hojas a los tejidos de reserva.

Las oligosacarinas u oligosacáridos direccionan los flujos energéticos de los vegetales al ser capaces de ocupar sitios de acción en algunas proteínas; esto afecta la actividad de las proteasas, lo que genera un superávit al evitar un mayor consumo calórico.

El Boro cumple con diferentes funciones que va desde la síntesis y transporte de azúcares, regulación de madurez además de la síntesis de hormonas.

El Magnesio es un nutriente fundamental en la síntesis de clorofila, activación enzimática, transferencia de energía y producción de azúcares.

El Zinc permite aumentar la cosecha de energía y minimiza el efecto destructivo de los radicales libres de O_2 sobre la molécula de clorofila.

Los Ácidos Carboxílicos actúan como precursores en la formación de azúcares, ya que incrementan la síntesis de mioinositol favoreciendo el flujo del carbono a través del ciclo metabólico de los sacáridos (Pentosa Fosfato).

Composición Garantizada:

• Ácido Ortosilícico	6.80 %
• Oligosacáridos	1.43 %
• Aminoácidos Totales	5.42 %

Beneficios:

- Eficientiza la captación de luz e incrementa la fotosíntesis.
- Favorece la síntesis y transporte de azúcares.
- Incrementa la síntesis de mioinositol, favoreciendo el ciclo metabólico de los sacárido

PRO MAS SUKRO/SU®

Ficha Técnica

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Esparrago, Zarzamora, Frambuesa, Berries, Fresa, Rosa	Desde 3 + 3 hasta 6 + 6	Aplicar 15 – 30 días antes de la poda para programación de producción
Papa	3 + 3	Aplicar 15 – 30 días antes de cosecha
Caña de Azúcar	5 + 5	Aplicar de 2 a 5 meses antes de la cosecha; en caña de riego aplicar por lo menos 1 mes antes de la suspensión del riego

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno

*** Tiempo de reentrada: cero días

Aplicación:

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
En el cultivo de caña de Azúcar se recomienda realizar aplicaciones aéreas con un volumen de mezcla de 40 a 30 L dependiendo si es en avión o helicóptero, procurando que las aplicaciones sean bajo las condiciones meteorológicas adecuadas para evitar pérdidas del producto.
En el caso de aplicaciones foliares en otros cultivos se recomienda utilizar un volumen mínimo de 60 L / ha, en quipo perfectamente calibrado para lograr la cobertura total del área foliar.
Este producto puede ser aplicado con aspersor de mochila o aspersor adaptado al tractor o bien con equipo aéreo.

ADVERTENCIAS:

PRO MÁS SUKRO® debe aplicarse solo (sin mezclas)

FITOTOXICIDAD:

PRO MÁS SUKRO® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: PRO MÁS SUKRO®, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: No tóxico

Riesgo para las aves: No tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis®
Innovando con Naturaleza