Stärke® SC Zinc

Ficha Técnica

Información General:

Stärke® SC Zinc pertenece a una nueva generación de agronutrientes en forma de suspensión concentrada, complementada con biomoléculas de origen natural que mejoran procesos fisiológicos de la planta.

Stärke® SC Zinc ofrece una rápida y eficiente absorción y traslocación de zinc a puntos de demanda, por lo que aporta una gran asimilación de este.

La alta concentración de zinc cubre los requerimientos de los cultivos y ayuda a la corrección de su deficiencia.

En coadyuvancia, las biomoléculas contenidas en **Stärke® SC Zinc** estimulan el metabolismo secundario de la planta ante la presencia de algún factor adverso de tipo biótico o abiótico como respuesta de protección para el cultivo.

Composición Garantizada:

• Zinc (Zn)	50.0 %

Beneficios:

- Alta concentración de Zinc
- Rápida absorción y asimilación por la planta
- Estimula la síntesis de auxinas y favorece el desarrollo de raíces y tallos
- Promueve la síntesis de proteínas y carbohidratos
- Biomoléculas que protegen y estimulan el metabolismo
- Osmoprotección y mejora de procesos fisiológicos en condiciones de estrés
- Incrementa la productividad de los cultivos

Stärke® SC Zinc

Ficha Técnica

Recomendaciones de uso:

USO FOLIAR

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
AGUACATE	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la brotación, de la floración y del desarrollo de frutos.
AJO, CEBOLLA	0.2 – 0.5	Aplicar cada 21 a 28 días después del trasplante, repetir a los 14 días y posteriormente al inicio del desarrollo del bulbo.
BANANO, PLÁTANO	0.3 – 0.5	Aplicar ante la aparición de síntomas visuales de deficiencias en las hojas nuevas (rayas cloróticas - blanquecinas).
BERRIES (FRESA, ARÁNDANO, ZARZAMORA, FRAMBUESA)	0.25 – 1.0	Realizar 3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo a intervalos de 14 días.
BRÓCOLI, COLIFLOR, COLES, LECHUGA	0.25 – 0.75	Aplicar a los 14 días posteriores al trasplante con la dosis baja. Realizar 2 a 3 aplicaciones adicionales a intervalos de 14 días.
CAÑA DE AZÚCAR	0.5 – 1.0	Aplicar en socas y resocas a los 60 a 90 días después de la brotación.
CULTIVOS BÁSICOS (MAÍZ, ARROZ, SORGO, TRIGO, CEBADA, FRIJOL, SOYA, CACAHUATE, CHÍCHARO)	0.25 – 0.5	Aplicar durante el crecimiento vegetativo y/o previo a la floración.
ESPÁRRAGO	0.5 – 1.0	Aplicar cada 30 días durante todo el ciclo del cultivo y en caso de observar deficiencias de zinc, aplicar la dosis más alta.
FRUTALES (LIMÓN, TORONJA, MANGO, PAPAYA, MANZANA, DURAZNO)	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la brotación, de la floración y del desarrollo de frutos.
HORTALIZAS (JITOMATE, TOMATE, CHILES, PIMIENTOS, PEPINO, SANDÍA, MELÓN, CALABACITAS)	0.25 – 0.75	Aplicar a los 14 días posteriores al trasplante. Repetir a los 14 días y una tercera aplicación al cuajado de frutos.
NOGAL	0.5 – 1.0	Realizar de 4 a 5 aplicaciones cada 21 días a partir de la brotación de yemas.
ORNAMENTALES (ROSA, GERBERA, CLAVEL, NOCHEBUENA)	0.5 – 1.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante el periodo vegetativo en todas las especies. En el caso de flores de corte, realizar aplicaciones complementarias durante el periodo de cosecha cada 7 a 14 días.
PAPA	0.25 – 0.75	Aplicar a los 14 días después de la emergencia y realizar de 3 a 5 aplicaciones cada 7 a 14 días.
PIÑA	0.5 – 1.0	Realizar de 3 a 4 aplicaciones por ciclo con intervalos de 30 a 60 días.
VID	0.25 – 0.75	Aplicar durante la brotación y desarrollo de frutos. Repetir cada 14 días.

*Las dosis pueden variar en función de las necesidades nutricionales en cada etapa fenológica.
**Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza

Stärke® SC Zinc

Ficha Técnica

USO EN FERTIRRIEGO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
BERRIES (FRESA, ARÁNDANO, ZARZAMORA, FRAMBUESA)	0.5 – 1.5	Aplicar cada 14 días en la etapa vegetativa. En la etapa de floración y cosecha realizar las aplicaciones cada 7 a 14 días.
BRÓCOLI, COLIFLOR, COLES, LECHUGA	1.0– 2.0	Realizar 3 aplicaciones durante el ciclo de cultivo en intervalos de 14 a 30 días.
CAÑA DE AZÚCAR	0.5 – 1.0	Aplicar en socas y resocas a los 60 a 90 días después de la brotación.
CEBOLLA, AJO, ZANAHORIA	1.0 – 2.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
ESPÁRRAGO	2.0 – 3.0	Aplicar cada 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
HORTALIZAS (JITOMATE, TOMATE, CHILES, PEPINO, PIMIENTOS, SANDÍA, MELON, CALABACITAS)	1.0 – 2.0	Aplicar cada 7 a 14 días durante todo el ciclo de cultivo.
ORNAMENTALES (ROSA, GERBERA)	0.5 – 1.5	Aplicar cada 14 a 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
PAPA	1.0 – 2.0	Aplicar cada 14 a 30 días durante todo el ciclo de cultivo.
PAPAYA, LIMÓN	2.0 – 3.0	Aplicar cada 30 días durante todo el ciclo de cultivo.

*Las dosis pueden variar en función de las necesidades nutricionales en cada etapa fenológica.
**Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza

Stärke® SC Zinc

Ficha Técnica

Aplicaciones:

Agite perfectamente el envase antes de usar el producto, ábralo cuidadosamente y mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Realice una premezcla en una cubeta con agua limpia y con la cantidad a utilizar del producto y agite. Posteriormente, agregue la premezcla al tanque de aplicación o mochila de aspersión con el volumen de agua necesario y agite nuevamente.

ADVERTENCIAS
Stärke® SC Zinc es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Sin embargo, es conveniente efectuar una prueba antes de hacer el mezclado.

FITOTOXICIDAD
Stärke® SC Zinc, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS
Riesgos para las personas: Stärke® SC Zinc, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.
Riesgo para las abejas: No tóxico
Riesgo para las aves: No tóxico
Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.

AV. Vallarta 6503 Local H7, Concentro, Col. Cuidad Granja, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010. Tel: (33) 3627 2208
www.arvensis.com.mx

Arvensis® Innovando con Naturaleza